

# اولین همایش ملی صدا، سلامتی و توسعه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲-۳ اسفند ۱۳۸۲

خلاصه مقالات

۱۰۴۴۱۰

The 1st National Summit on  
Noise, Health & Development

Mashhad University of Medical sciences - February 21-22, 2004

P = ۲۸

## بررسی شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان

محمد رضا منصوریان، شهلا خسروان

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی گناباد



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

**مقدمه و اهداف:** اختلالات شنوایی بعد از سالمندان در کودکان شیوع بیشتری دارد که عمدتاً بعلت اوتیت گوش میانی است که در کودکی شروع می‌شود و تا سن بلوغ ادامه می‌یابد و می‌تواند باعث کم شنوایی دائمی شود. توجه به سلامت شنوایی قبل از سن مدرسه و در جریان یادگیری درس از اهمیت بسیار برخوردار است. زیرا اختلالات شنوایی در مرحله اول مشکل رشد گویایی و بلوغ فکری و در مرحله دوم آشفتگی‌های یادگیری را به دنبال خواهد داشت. بدین منظور پژوهشی با هدف تعیین شیوع و انواع اختلالات کم شنوایی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در کودکان دبستانی شهر گناباد در سال ۱۳۷۹ انجام گردید.

**مواد و روش کار:** این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه پژوهش کودکان دبستانی شهر گناباد می‌باشد. حجم نمونه مشتمل بر ۵۴۳ نفر از دانش آموزان مشغول به تحصیل در ۵ دبستان شهر گناباد که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، ابزار جمع آوری داده‌ها شامل پرسشنامه، فرم مشاهده و معاینه بوده و همه نمونه‌های انتخاب شده مورد آزمون اولیه اودیومتری و اتوسکوپی قرار گرفته و دانش آموزانی که حد شنوایی آنها بیشتر از ۱۵ دسی بل بود مورد معاینات دقیق‌تر از طریق تست دیاپازونی و پر، تمپانومتری و اودیومتری قرار گرفته‌اند. سپس داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردیده و نتایج بصورت جداول توزیع فراوانی و توانقی بیان شده است.

**نتایج پژوهش:** نتایج پژوهش نشان میدهد که ۴٪/ نمونه‌ها دچار افت شنوایی بوده‌اند. ۱۰۰٪ موارد کاهش شنوایی در گوش راست و ۳٪/ ۹۵٪ موارد افت شنوایی گوش چپ از نوع انتقالی و ۴٪/ ۷٪ بقیه از نوع مخلوط بوده‌است. میزان کاهش شنوایی در گوش راست ۲۱٪/ از نمونه‌ها در حد Slight و ۷٪/ ۸۰٪ در حد mild است. کاهش شنوایی در گوش چپ ۱۷٪/ نمونه‌ها در حد ۲٪، Slight ۱۵٪/ در حد mild و ۴٪/ در حد moderate و بقیه طبیعی بوده‌اند. میانگین معدل دانش موزان مبتلا به کاهش شنوایی با دانش آموزان سالم تفاوت معنی داری نشان داده است ( $P<0.05$ ).

**نتیجه گیری نهایی:** افت تحصیلی به عنوان یکی از عوامل احتمالی کاهش شنوایی، بصورت دیررس و در موارد شدید و پیشرفت بیماری خود را نشان می‌دهد. بنابراین توجه صرف به این علامت برای تشخیص کاهش شنوایی می‌تواند موجب عدم توجه به این شکل در مراحل اولیه گردد. لذا توصیه می‌شود معاینات دوره‌ای شنوایی کودکان دبستانی در تمام پایه‌ها با روش دقیق‌تر صورت گیرد.

**واژه‌های کلیدی:** کودکان دبستانی، اختلالات کم شنوایی، پیشرفت تحصیلی